



Niniejszy dokument stanowi nieautoryzowane tłumaczenie niewielkiego fragmentu oryginalnego dokumentu

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie Seksuologii Dotyczące zasad badania Fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie Seksuologii dotyczące zasad badania fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

Zalecenia Krajowego Konsultanta w dziedzinie Seksuologii dotyczące zasad badania fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

Autor:

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Wprowadzenie:

Pojawienie się specjalizacji zajmującej się leczeniem zaburzeń seksualnych i zagadnień związanych z seksualnością człowieka, czyli tzw. seksuologii medycznej rozwinęło definicję badania seksuologicznego obejmującego takie czynności jak:

- wywiad pacjenta (pacjentki);
- badanie fizykalne;
- wykonywanie badań laboratoryjnych;
- stosowanie kwestionariuszy, testów;
- metody inwazyjne np. iniekcje diagnostyczne w ciała jamiste członka.

Często badania fizykalne są negatywnie odbierane przez pacjentów i wiążą się z przekroczeniem bariery intymności. Coraz częściej można usłyszeć zarzuty zwłaszcza ze



Niniejszy dokument stanowi nieautoryzowane tłumaczenie niewielkiego fragmentu oryginalnego dokumentu

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie Seksuologii Dotyczące zasad badania Fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

strony pacjentek na temat źle przeprowadzonych badań, braku bądź przekazywania niepełnej informacji na temat przebiegu badania, a także zarzuty mówiące o świadomym pobudzaniu seksualnym pacjentek.

Zasady przeprowadzenia badań fizykalnych w innych krajach:

- Federacja Stanowych Rad Lekarskich w USA zakazuje dotykania pacjentek w okolicy narządów płciowych, piersi w innych celach niż w celach medycznych, a także zakazuje masturbowania się w obecności seksuologa.
- W Wielkiej Brytanii osobie poddającej się badaniu fizykalnemu umożliwia się powołanie świadka np. pielęgniarki bądź lekarza, który to fakt następnie jest odnotowywany w dokumentacji pacjenta. Jeżeli lekarz bada pacjentkę, to osobą pełniącą rolę świadka powinna być kobieta i należeć do personelu medycznego.
- Kraje islamskie prowadzą badania lekarskie przez otwór w prześcieradle bądź za pomocą koca zastaniającego pacjentkę. Badanie przeprowadzane jest zawsze w obecności mężczyzny należącego do rodziny pacjentki w sytuacji gdy badanie prowadzi lekarz.
- Zgodnie z zasadami Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego pacjenci muszą wyrazić świadomą zgodę na przeprowadzenie badań fizykalnych.

Wskazania do badania fizykalnego pacjentek:

- ból związany z odbywaniem stosunku płciowego;
- utrata zainteresowania życiem seksualnym;
- kobiety w okresie pomenopauzalnym, które utraciły zainteresowanie seksem;
- podejrzenie dysfunkcji związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem narządów płciowych.

Zalecenia dotyczące badania fizykalnego u pacjentek, u których występują zaburzenia seksualne:

1. Należy przedstawić dokładny cel i przebieg badania.



Niniejszy dokument stanowi nieautoryzowane tłumaczenie niewielkiego fragmentu oryginalnego dokumentu

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie Seksuologii Dotyczące zasad badania Fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

2. Należy uzyskać pisemną zgodę od pacjenta na wykonanie badania na specjalnym formularzu informującym o przebiegu badania.
3. Jeśli pacjent zna uprzednio cel i sposób badania to badanie może być przeprowadzone na pierwszej wizycie w przeciwnym razie należy ustalić termin badania.
4. Badanie powinno być wykonywane z zapewnieniem komfortu psychicznego i bez pośpiechu.
5. W czasie badania powinien być zachowany kontakt wzrokowy i dostosowanie ruchów do indywidualnej pacjentki.
6. W czasie badania pochwy należy używać jednorazowych rękawiczek zwilżonych kremem nawilżającym.

Wskazania do badania fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi:

- mężczyźni w wieku powyżej 50 lat z zaburzeniami seksualnymi;
- objawy fizykalne w przypadku mężczyzn u których nie przeprowadzono diagnozowania klinicznego;
- zaburzenia rozwojowe i hormonalne związane z narządami płciowymi;
- gdy pacjent jest przekonany że przyczyną zaburzeń seksualnych są nieprawidłowości budowy narządu płciowego albo gdy odczuwa dyskomfort związany z własnym ciałem.

Zalecenia dotyczące badania fizykalnego u pacjentów, u których występują zaburzenia seksualne:

1. Podobne jak w przypadku kobiet.
2. Badanie narządów płciowych pacjentów można przeprowadzić w zależności od preferencji pacjenta w pozycji bocznej lub stojącej.



Niniejszy dokument stanowi nieautoryzowane tłumaczenie niewielkiego fragmentu oryginalnego dokumentu

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie Seksuologii Dotyczące zasad badania Fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi

3. Badanie ręczne u mężczyzny składa się z: oceny wyglądu narządów, rozmiaru jąder i członka, napletka, gruczołu krokowego a także napięcia mięśni odbytu.
4. Ewentualnie wykonać badanie USG.